

# 勝昌藥誌

ISSN 0255-6154

南板藍根



夏

第五十四卷第二期

中華民國一一一年六月三十日出版

中華郵政臺字第 2717 號登記執照登記為第一類新聞紙類



### 發行所：勝昌藥誌雜誌社

創刊日期：1969 年 1 月 15 日

出刊日期：2022 年 06 月 30 日（第五十四卷第二期，總號第 214 期）

地址：臺北市中正區和平西路二段 56 號

本刊英文通訊處：No. 56, Sec. 2, Heping W. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10070, Taiwan

網址：<http://www.herb.com.tw>

電話：02-23011268

### 主編者：本刊編輯委員會

地址：桃園市中壢區民族路六段 436, 436-1 號

電話：03-4909682 分機 317

傳真：03-4201998

### 勝昌藥誌叢書購買方式

請參考叢書目錄，將欲購買品項售價總金額，匯款或轉帳至：

銀行：彰化銀行 (009)

分行：光復分行 (5609)

戶名：勝昌製藥廠股份有限公司

帳號：5609-01-16971-7-00

※ 手續完成後，請電話告知。連絡電話：03-4909682 分機 317

### 勝昌藥誌叢書目錄

書名	編著	定價	售價
常用中草藥手冊	李沐勳 李威著	250 元	200 元
勝昌藥誌 34-36 卷合訂本		900 元	720 元
勝昌藥誌 37-39 卷合訂本		900 元	720 元
勝昌藥誌 40-42 卷合訂本		900 元	720 元
勝昌藥誌 43-45 卷合訂本		900 元	720 元
勝昌藥誌 46-48 卷合訂本		900 元	720 元
勝昌藥誌 49-51 卷合訂本		900 元	720 元



SHENG CHANG

勝昌製藥

# 關心您的健康



好藥出自好藥材

勝昌為優良產品的原料嚴格把關

先進的萃取、濃縮設備

陣容堅強的研發團隊

製造出有效且精純的優質產品



勝昌製藥廠股份有限公司  
SHENG CHANG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

公 司：台北市和平西路二段56號  
中壢廠：桃園市中壢區民族路六段436號  
網 址：<http://www.herb.com.tw>

電 話：(02)23011267  
電 話：(03)4909682

# 龜鹿二仙丸



## 龜鹿二寶

填精氣

、益筋骨、明睛目、藥性溫和。

## 膠鈣雙補

純中藥  
GMP



(勝昌製藥廠)

六十餘年製藥經驗，產品通過各項檢驗，  
品質好、藥效佳、絕不含塑化劑，  
消費者請安心選購。

服務專線：0800261030

請洽勝昌藥品服務處或各地中藥行購買

(適用對象)

骨質疏鬆傾向者、常常腰酸背痛者  
視力衰退者、體質虛弱者。

(效能)

大補精髓、益氣養神、治視物不清。

衛署 成製字第010860號

桃市中藥廣字第1081110020號

公司：台北市中正區和平西路二段56號(寧波西街口)

工廠：桃園市中壢區民族路六段436號

電話：02-23011268

網址：[www.herb.com.tw](http://www.herb.com.tw)



勝昌製藥廠股份有限公司

Sheng Chang Pharmaceutical Co., Ltd

# 目錄 Contents

勝昌藥誌  
第五十四卷第二期

04 封面植物說明 -- 南板藍根

08 臺灣常用中草藥 -- 過塘蛇

09 臺灣常用中草藥 -- 大葉仙茅

12 中藥飲片炮製介紹 -- 山茱萸


17 專題報導 -- 清熱降火良藥 - 寒水石

22 專題報導 -- 附子臨床用法探義 (下)

26 勝昌新聞 -- 勝昌製藥與大甲媽同心

28 醫藥新聞 -- 鄭市長參訪「臺灣清冠

一號」製藥廠



# 南板藍根

本刊資料室

## 【基原】

為爵床科 *Acanthaceae* 植物馬藍 *Strobilanthes cusia* (Nees) Kuntze 之乾燥根莖及根。

本品之稀乙醇抽提物不得少於 6.0%，水抽提物不得少於 8.0%。（《臺灣中藥典》）

## 【原植物】

多年生草本，高 30~70 cm。乾時莖葉呈藍色或墨綠色。根莖粗壯，斷面呈藍色。地上莖基部稍木質化，略帶方形，稍分枝，節膨大，幼時被褐色微毛。葉對生；葉柄長 1~4 cm；葉片倒卵狀橢圓形或卵狀橢圓形，長 6~15 cm，寬 4~8 cm；先端急尖，微鈍頭，基部漸狹細，邊緣有淺鋸齒或波狀齒或全緣，上面無毛，有稠密狹細的鍾乳線條，下面幼時脈上稍生褐色微軟毛，側脈 5~6 對。花無梗，成疏生的穗狀花序，頂生或腋生；苞片葉狀，狹倒卵形，早落；花萼裂片 5，條形，長 1~1.4 cm，通常一片較大，呈匙形，無毛；花冠漏斗狀，淡紫色，長


4.5~5.5 cm，5裂近相等，長 6~7 mm，先端微凹；雄蕊 4，2 強，花粉橢圓形，有帶條，帶條上具兩條波形的脊；子房上位，花柱細長。蒴果為稍狹的匙形，長 1.5~2 cm。種子 4 頭，有微毛。花期 6~10 月，果期 7~11 月。

生於山地、林緣潮濕的地方，野生或栽培。分佈於江蘇、浙江、福建、湖北、廣東、廣西、四川、貴州、雲南等地。（《中華本草》）

## 【藥材性狀】

### 1. 一般性狀：

本品根莖圓柱形略方，有分枝，直徑 2~6 mm。表面灰棕色，有膨大的



南板藍根飲片圖

節，節上生多數細長彎曲的根，直徑約 1 mm；上部帶地上莖，有時莖上有對生分枝。質堅脆，折斷面不平坦，中心髓部大。氣弱，味淡。

## 2. 組織：

本品根莖橫切面，表皮細胞 1 層。皮層較寬，細胞切向延長；鐘乳體細胞較多，類圓形或橢圓形，直徑 17~33  $\mu\text{m}$ ；纖維單個散在或成束；內皮層明顯。韌皮部較窄；纖維單個散在或成束，壁微木質化或無木質化。木質部導管單個散在或數個相聚；木纖維較發達，壁木質化。髓線寬，2~8 層細胞。髓部細胞紋孔明顯；鐘乳體細胞少數。

## 3. 粉末：

本品粉末黃棕色。無特殊臭氣，味略苦。表皮細胞呈類圓形、類方形或類長方形，切線性排列。皮層由薄壁細胞組成，為卵圓形、橢圓形、長橢圓形、類方形、類長方形或長多角形等，含鐘乳體及澱粉粒。髓線細胞呈橢圓形、長橢圓形、方形、長多角形，放射狀排列。形成層細胞呈長方形、長扁平形，切線性延長。木質部薄壁細胞呈類圓形、略等徑角形，膜厚，強木質化。木質部髓線細胞呈類方形、類長方形、橢圓形或長橢圓形。木質部纖維具隔膜，呈類圓形、長橢形或略等徑多角形，膜壁厚化，



馬藍植物圖

強木質化。導管，強木質化，以有緣孔紋及網紋為主。具纖維狀與管狀假導管。髓細胞呈類圓形、等徑性多角形或長多角形，有細胞間隙，含鐘乳體及澱粉粒。  
(《臺灣中藥典》)

### 【採收加工】

初冬採挖，除去莖葉，洗淨，曬乾。  
(《中華本草》)

### 【藥性】

《中華本草》：「味苦，性寒。歸心、肝、胃經。」

《本草述》：「苦，寒。無毒。」

《四川中藥志》1960年版：「入肝、胃經。」

《重慶草藥》：「味苦、鹹，性寒。」

《廣西本草選編》：「味甘、苦，性寒。」

《雲南中草藥》：「微苦，寒。」

《中國藥典》2020年版：「苦，寒。歸心、胃經。」

《臺灣中藥典》：「苦，寒。歸心、胃經。」

### 【炮製】

取原藥材，除去雜質，搶水洗淨，悶潤，切成薄片，乾燥，篩去灰屑。

飲片性狀：為類圓形、大小不一的薄片。外表皮灰棕色或暗棕色。切斷面顯纖維性，中部有白色海綿狀的髓。質硬而韌。

氣微，味微苦。

貯乾燥容器內，置通風乾燥處，防蛀。  
(《中華本草》)

### 【功能與主治】

《中華本草》：「清熱解毒。涼血消腫，主治溫毒發斑，高熱頭痛，大頭瘟疫，丹毒，痄腮，病毒性肝炎，流行性感冒，肺炎，瘡腫，疮疹。」

《本草圖經》：「(馬藍)連根採之，焙，搗，下篩，酒服錢匕，治婦人敗血。」

《現代實用中藥》：「清涼解熱，解毒。用於丹毒，產褥熱，大頭瘟，產後傷寒，



馬藍植物圖



馬藍植物圖

小兒游丹。」

《四川中藥志》1960年版：「清熱解毒，避疫殺蟲。治傷寒發斑，丹毒，瘧疫發頤及大頭瘟。」

《廣西中草藥》：「涼血止血，清熱解毒。治乙腦，流感，流腦，肝炎，腮腺炎，咽喉炎，口腔炎，扁桃體炎，丹毒，毒蛇咬傷。」

《廣西本草選編》：「治鈎端螺旋體病，上呼吸道感染。」

《雲南中草藥》：「治小兒疳積，痢疾，血吸蟲病。」

《中國藥典》2020年版：「清熱解毒，涼血消斑。用於溫疫時毒，發熱咽痛，溫毒

發斑，丹毒。」

《臺灣中藥典》：「清熱解毒，涼血利咽。」

### 【用法用量】

內服：煎湯，15~30 g，大劑量可用至60~120 g；或入丸、散。

外用：適量，搗敷或煎湯熏洗。（《中華本草》）

### 【使用注意】

《中華本草》：「脾胃虛寒、無實火熱毒者慎服。」

《四川中藥志》1960年版：「凡非實熱及虛弱作瀉者慎用。」

# 過塘蛇

本刊資料室

## 【基原】

為柳葉菜科 Onagraceae 植物水龍

*Ludwigia adscendens* (L.) Hara [ *Jussiaea adscendens* L.; *J. repens* L.] 的全草。

## 【型態特徵】

多年生水生草本，莖匍匐或上升，高 30~60 cm。根莖甚長，橫走泥中，具白色囊狀呼吸根，節上有鬚根；浮水莖伸長達 4 m。植物體通常無毛，但在陸地上的分枝幼時密被長柔毛。葉互生；葉柄長達 1.5 cm，有時近無柄；葉片倒披針形或橢圓形，長 1.5~5 cm，寬 0.5~2.5 cm，先端鈍或渾圓，基部漸窄成柄，全緣，上面綠色，下面紫紅色。花兩性，單生於葉腋，白色，基部淡黃色，花梗長 2~3 cm，先端常有鱗片狀小苞片 2；花萼裂片 5，披針形，長 6~7 mm，外面疏被長柔毛，萼筒與子房貼生；花瓣 5，乳白色，基部黃色，倒卵形，長 1~1.2 cm，寬 6~8 mm；雄蕊 10，不等長；子房下位，外面疏被長柔毛，柱頭頭狀，膨大，5 淺裂。蒴果細長圓柱形，長 2~3 cm，直徑約 3 mm，有時散生長柔毛，具多數種子。花期 5~8 月。

生於海拔 500~1500 m 的水田或淺水池塘中。分布於浙江、江西、福建、廣東、海南、廣西、四川、雲南等地。

## 【採收加工】

夏、秋季採收，洗淨，鮮用或曬乾。

## 【性味】

味苦、微甘，性寒。

## 【功能與主治】

清熱，利尿，解毒。主治感冒發熱，燥熱咳嗽，高熱煩渴，淋痛，水腫，咽痛，喉腫，口瘡，風火牙痛，瘡癰疔腫，燙火傷，跌打傷腫，毒蛇、狂犬咬傷。

## 【用法用量】

內服：煎湯，10~30 g；或搗汁。

外用：適量，搗敷或燒灰調敷；或煎湯洗。

## 【使用注意】

脾胃虛寒者慎服。



# 大葉仙茅

本刊資料室



## 【基原】

為仙茅科植物大葉仙茅 *Curculigo capitulata* (Lour.) O.Kuntze [*Leucojum capitulata* Lour.] 的根莖。

## 【型態特徵】

多年生草本，高達 1 m 多。根莖粗厚，塊狀，具細長的走莖。葉基生，通常 4~7 片；葉柄長 30~80 cm，上面有槽，側背面均被短柔毛；葉片長圓狀披針形或近長圓形，長 40~90 cm，寬 5~14 cm，紙質，全緣，先端長漸尖，具折扇狀脈，背面脈上具短柔毛或無毛。花葶從葉腋發出，通常短於葉，長 (10~)15~30 cm，密被褐色長柔毛；總狀花序強烈縮短成頭狀，球形或近卵形，俯垂，長 2.5~5 cm，具多數排列密集的花；苞片卵狀披針形至披針形，長 1.5~2.5 cm 被毛；花黃色，具長約 7 mm 的花梗；花被裂片 6，卵狀長圓形，長約 8 mm，寬 3.5~4

mm，先端鈍，外輪的背面被毛，內輪的僅背面中脈或中脈基部被毛；雄蕊 6，花絲長不及 1 mm，花藥線形，長約 5 mm；花柱比雄蕊長，纖細，柱頭近頭狀，有極淺的 3 裂，子房長圓形或近球形，被毛。漿果近球形，白色，直徑約 4~5 mm，無喙；種子黑色，表面具不規則的縱凸紋。花期 5~6 月，果期 8~9 月。

生長於海拔 850~2200 m 的林下或陰濕處。分佈於臺灣、華南、西南及江西、福建、西藏等地。

## 【採收加工】

夏、秋季採挖，除去葉，洗淨，切片曬乾。

## 【性味】

味辛、微苦，性溫。

## 【功能與主治】

補腎壯陽，祛風除濕，活血調經。主治腎虛咳嗽，陽痿遺精，白濁帶下，腰膝痠軟，風濕痹痛，宮冷不孕，月經不調，崩漏，子宮脫垂，跌打損傷。

## 【用法用量】

內服：煎湯，6~9 g；或入丸、散。

外用：適量，研末調敷。

# 陣容堅強開發團隊 國際認證實驗室

TAF和TFDA ISO/IEC17025實驗室雙重認證



勝昌檢驗中心在中藥領域具有數十年的檢驗經驗，並通過「財團法人全國認證基金會（TAF）」及「衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）」的認證，符合ISO/IEC 17025國際標準，可出具有公信力的檢驗報告。

## 專業

提供專業的諮詢  
及可靠、精確、快速  
高品質的檢驗服務

## 誠信服務

以誠信及公正為原則  
值得客戶信賴的  
第三方檢驗機構

## 公信認證

通過TAF及TFDA  
ISO/IEC 17025  
實驗室認證



勝昌製藥廠股份有限公司

SHENG CHANG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

地址：桃園市中壢區民族路六段436號  
檢驗諮詢：03-490-9682 #874  
傳真：03-420-1998  
網址：<http://www.herb.com.tw>



● 農藥殘留檢驗(GC/MS/MS)



● 藥材基原鑑定(組織切片)



● 個別重金屬檢驗(ICP-MS)




● 黃麴毒素檢驗(HPLC)

# 勝昌檢驗中心服務項目



## 一、藥材基原鑑定：

組織切片、粉末鏡檢



## 二、定性分析：

TLC鑑別


## 三、定量分析：

指標成分含量分析 ( HPLC ) — 臺灣中藥典第三版-定量成分


精油含量測定

## 四、異常物質檢測：

總重金屬 ( 以鉛計 )




個別重金屬 ( ICP-OES ) — 鉛、鎘、汞、砷、銅




黃麴毒素 ( HPLC ) — Aflatoxin ( B<sub>1</sub> 、 B<sub>2</sub> 、 G<sub>1</sub> 、 G<sub>2</sub> )



農藥殘留 — 有機氯劑 ( 總DDT 、總BHC 、總PCNB )



二氧化硫 ( SO<sub>2</sub> )



## 五、微生物檢驗：


好氧性微生物總數、大腸桿菌、沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、

綠膿桿菌、黴菌及酵母菌總數


## 六、其他：

五大項檢驗 — 水分、總灰分、酸不溶性灰分、水抽提物含量測定、

稀乙醇抽提物含量測定



塑化劑 — DMP 、 DEP 、 DIBP 、 BBP 、 DBP 、 DEHP 、 DNOP 、



DINP 、 DIDP



勝昌製藥廠股份有限公司

SHENG CHANG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

地 址：桃園市中壢區民族路六段436號

檢驗諮詢：03-490-9682 #874

傳 真：03-420-1998

網 址：<http://www.herb.com.tw>

# 中藥飲片炮製介紹 --- 山茱萸

勝昌製藥技術部 魏昌福

## 前言：

依據《臺灣中藥典》與《中國藥典》記載，山茱萸藥材來源為山茱萸科植物山茱萸 *Cornus officinalis* Sieb. et Zucc. 的乾燥成熟果肉；具有補益肝腎，收澀固脫的功效<sup>1,2</sup>。山茱萸始載於《神農本草經》，列為中品。其炮製於南北朝《雷公炮炙論》，曰“須去內核。每修事去核子一斤，取肉皮用，只秤成四兩以末，緩火熬之，方用”；歷代使用的炮製品有山萸肉（山茱萸肉）、炒山茱萸、麸炒山茱萸、鹽炒山茱萸、醋炒山茱萸、酒潤山茱萸、清蒸山茱萸、酒萸肉（酒蒸或酒燉山茱萸）、醋蒸山茱萸及蜜蒸山茱萸等<sup>1-8</sup>。現代炮製以山萸肉及酒萸肉較為常用，在此介紹這二種飲片的炮製方法及相關資訊，以供同好參考。

## 一、炮製方法

### 1. 山萸肉（別名：山茱萸、山茱萸肉、萸肉）：

除去雜質和殘留果核<sup>2-8</sup>。

### 2. 酒萸肉（別名：酒蒸山茱萸、酒燉山茱萸、酒山茱萸）：

取淨山茱萸肉，用黃酒拌勻，待酒被吸盡，裝罐內或適宜的蒸製容器內，密閉，放水鍋內，用武火加熱，隔火燉或蒸籠蒸至色變黑潤，取出，乾燥。每 100 kg 山茱萸肉，用黃酒 20 kg<sup>2-8</sup>。

## 二、飲片性狀

### 1. 山萸肉（圖 1）：

本品呈不規則的片狀或囊狀，長 1 ~ 1.5 cm，寬 0.5 ~ 1 cm。表面紫紅色至紫黑色，皺縮，有光澤。頂端有的有圓形宿萼痕，基部有果梗痕，質柔軟。氣微，味酸、澀、微苦<sup>1,2</sup>。

### 2. 酒萸肉（圖 2）：

本品形如山茱萸，表面紫黑色或黑色，質滋潤柔軟。微有酒香氣<sup>2-8</sup>。




圖 1 山茱萸肉飲片圖



圖 2 酒茱萸肉飲片圖

### 三、炮製研究

#### 1. 方法與品質研究：

現代炮製研究顯示，山茱萸果核、果肉均含有沒食子酸、蘋果酸等多種成分。用薄層掃描儀測定的結果顯示，果肉含沒食子酸 0.0623 %，含 *d,l*-蘋果酸 0.907 %；果核含沒食子酸 0.1276 %，含 *d,l*-蘋果酸 0.544 %。果核 ( $LD_{50}$ ，生藥含量 90.8 g/kg) 比果肉 ( $LD_{50}$ ，生藥含量 53.55 g/kg) 更低，二者對金黃色葡萄球菌和痢疾桿菌等均顯示有相當的抑菌作用。由於傳統山茱萸用藥均強調去核用肉，但也有文獻記載果核可以打碎入藥，因此關於山茱萸藥材是否去核的研究，雖然有研究顯示果核與果肉的化學成分相似等，但因相關的研究尚未成熟，故目前仍維持去核用果肉的傳統用藥習慣<sup>7</sup>。

其次，關於優化酒燉山茱萸炮製條件的研究，有學者採用 HPLC 法測定樣品的

莫諾昔及馬錢子昔含量，以黃酒的加入量、悶潤時間、炮製時間三因素進行評估，結果顯示酒燉山茱萸的最佳條件為：取淨山茱萸肉加 20 % 黃酒，悶潤 1 小時，隔水加熱燉 6 小時，所得的酒燉山茱萸飲片中的莫諾昔及馬錢子昔含量最高。此外，還有文獻報導山茱萸不同炮製品所得多糖含量：總糖含量是清蒸品最高、鹽蒸品最低，糖醛酸含量是鹽蒸品最高、醋蒸品最低，蛋白質含量是醋蒸品最高、鹽蒸品最低。從多糖的得率及各成分的含量與補益功效綜合評估，以酒蒸方法最佳，醋蒸、清蒸其次，而鹽蒸則不宜採用。還有學者以正交試驗優選加壓酒製山茱萸炮製工藝的研究，以山茱萸中馬錢子昔、莫諾昔、熊果酸及齊墩果酸作為評價指標，採用加酒量、悶潤時間、蒸製溫度及蒸製時間對炮製工藝的影響，結果顯示最佳的炮製程序為：加酒量為藥材的 25%，悶潤時間為 30 分鐘，蒸製溫度為 115°C，蒸製時間為 60 分

鐘。此項研究所得酒萸肉飲片外觀紫黑色有光澤，品質穩定，是一種能夠適用於山茱萸企業規模化生產的炮製方法<sup>8,9</sup>。

## 2. 化學與藥理研究：

山茱萸的果肉含有環烯醚萜類成分，如馬錢子苷(loganin)、莫諾苷(morroniside)、7-O-甲基莫諾苷(7-O-methyl morroniside)、7-脫氫馬錢素(dehydrologanin)、山茱萸苷(cornin)、山茱萸新苷(cornuside)、獐芽菜苷(sweroside)等；還含三萜類化合物，如熊果酸(ursolic acid)、齊墩果酸(oleanolic acid)等；還含鞣質類成分，如異訶子素(isoterchebin)、山茱萸鞣質I-II(tellimagrandins I-II)、1,2,3-三-O-沒食子醯基-β-D-葡萄糖(1,2,3-tri-O-galloyl-β-D-glucose)、路邊青鞣質D(gemin D)、喜樹鞣質A、B(camptotheins A-B)、棟木鞣質A、B、C、D、E、F、G(cornusiins A-G)等；尚含有機酸類成分，如酒石酸(tartaric acid)、蘋果酸(malic acid)、檸檬酸(citric acid)、琥珀酸(amber acid)、沒食子酸(galic acid)等<sup>1,3,10</sup>。

現代藥理研究顯示，山茱萸水煎劑腹腔給藥使小鼠胸腺明顯萎縮，減慢網狀內皮細胞對碳粒的廓清率，可抑制綿羊紅血球(SRBC)或2,4-二硝基氯苯(DNCB)所致小鼠遲發性超敏反應和減輕2,4-二硝基氯苯(DNCB)所致接觸性皮炎，但它也能升高小鼠血清溶血素抗體含量及血清抗免疫球蛋白G(IgG)含量，顯示出具有免疫調節作用。其次，山茱萸水煎劑對醋酸引起的小鼠腹腔毛細血管通透性增高，大鼠棉

球肉芽組織增生、二甲苯所致的小鼠耳廓腫脹以及蛋清引起的大鼠足蹠腫脹等炎症有抑制作用，還能降低大鼠腎上腺內抗壞血酸的含量，顯示具有抗炎作用。此外，山茱萸還具有抗心律失常、強心、抗休克、抑制血小板聚集、抗血栓形成、降血糖及抗菌等作用<sup>3,10</sup>。

## 四、臨床應用

### 1. 功效應用：

中醫理論認為山茱萸具有補益肝腎，收澀固脫的功效。常用於眩暈耳鳴，腰膝酸痛，陽痿遺精，遺尿尿頻，崩漏帶下，大汗虛脫，內熱消渴<sup>2,3</sup>。山茱萸的炮製作，一般認為生用以斂陰止汗力勝，多用於自汗盜汗；蒸製以補腎澀精，固精縮尿力強，多用於眩暈陽痿；酒蒸，借酒性溫通，有助藥勢，可增強溫補肝腎作用<sup>3,6-8</sup>。

在臨床應用上，山茱萸為治肝腎不足者的常用藥，如肝陰虛，暈眩耳鳴，骨蒸潮熱，腰膝痠軟，常與地黃、丹皮同用，滋補肝腎而清虛熱，如《小兒藥證直訣》六味地黃丸；若腎氣不足，腰痛腳弱，下肢覺冷，少腹拘急，小便不利或頻數，常與地黃合附子、桂枝同用，使“陽得陰助”，以補腎氣，如《金匱要略》腎氣丸。其他常用方劑如右歸丸、左歸丸、杞菊地黃丸、知柏地黃丸、麥味地黃丸、濟生腎氣丸、山茱萸散、山茱萸丸、草還丹、定心湯及還少丹等，可隨證加減應用。

### 2. 用法用量：

內服：煎湯，6～12 g；或入丸、散<sup>2,3</sup>。

使用注意：命門火熾、素有濕熱、小便淋澀者禁服<sup>3</sup>。

## 結語

綜上所述，山茱萸常見的炮製有山萸肉及酒萸肉二種方法，目的是要提高飲片品質與增加療效，以達到安全、均一與有效的用藥要求；在相關的炮製研究指出，不同的輔料炮製山茱萸對多糖得率及各成分的含量綜合評估，以酒蒸方法最佳，醋蒸、清蒸其次；同時以正交試驗優選加壓酒萸肉飲片的炮製工藝，認為加壓可縮短炮製時間且酒萸肉飲片品質穩定，可適用於企業規模化生產的方法；另外藥理研究顯示山茱萸具有免疫調節、抗心律失常、降血糖、抗炎及抗菌等藥理作用。因此，在臨床應用山茱萸時，應根據病情病況的需要，選用適宜對證的飲片或處方，才能讓藥物的療效完全發揮並避免不良反應的產生。



山茱萸植物圖

## 參考資料：

- 衛生福利部臺灣中藥典編輯委員會，2021，臺灣中藥典第四版，衛生福利部，頁 24-25。
- 國家藥典委員會，2020，中華人民共和國藥典 2020 年版一部，中國醫藥科技出版社，頁 29-30。
- 國家中醫藥管理局中華本草編委會，1999，中華本草（五），上海科學技術出版社，頁 738-742。
- 中華人民共和國藥政管理局，1988，全國中藥炮製規範 1988 年版，人民衛生出版社，頁 116-117。
- 葉定江，2002，中藥炮製學，知音出版社，頁 282-283。
- 呂俠卿，1999，中藥炮製大全，湖南科學技術出版社，頁 258。
- 金世元、王琦，2004，中藥飲片炮製研究與臨床應用，化學工業出版社，頁 75-78。
- 童承福，2011，臺灣常用中藥材炮製實務彙編，行政院衛生署中醫藥委員會，頁 414-416。
- 許甜甜、聶松柳、沈炳香、吳德玲、金傳山，2014，正交試驗優選加壓酒製山茱萸炮製工藝，中草藥 45(16)：2339-2343。
- 趙中振、蕭培根，2006，當代藥用植物典（第一冊），香港賽馬會中藥研究院有限公司，頁 256-259。



# 勝昌新漢方

日夜守護家人健康



## 調整體質不卡關 生活真輕鬆

滋潤保養元素，補充調節生理機能。

不僅使行動力維持，對於每日的精氣神也有所助益。

靈活  
四元素



龜鹿萃取



膠原蛋白



葡萄糖胺



軟骨素

## 對付健康隱形殺手 促進新陳代謝

以紅麴為首，納豆萃取物(含納豆激酶)和紅景天為輔，幫助調整體質、促進新陳代謝。

代謝  
金三角



草本配方



紅麴



納豆

勝昌製藥廠股份有限公司中壢廠  
臺北市中正區和平西路二段56號  
桃園市中壢區民族路六段436號  
訂購電話：0800-261-099

watsons 獨家販售

販售據點： 大樹藥局 Great Tree

葉健康

勝昌購物商城



# 清熱降火良藥 - 寒水石

勝昌製藥技術部 許哲綸

## 前言：

依據《中華本草》記載，寒水石又稱凝水石、白水石、凌水石、鹽精等，藥材來源為硫酸鹽類石膏族礦物石膏 Gypsum 或為碳酸鹽類方解石族礦物方解石 Calcite，石膏採出後選出粉紅色、灰白色、塊狀或纖維狀集合體即紅石膏藥用，稱北寒水石；方解石採出後多選無色、透明或白色解理狀塊體藥用，稱南寒水石<sup>4</sup>。

## 一、寒水石名字的由來

相傳有一支商隊在沙漠途中，水喝光了，數人因不勝天氣炎熱而中暑，便搭起帳篷，領隊令人照顧中暑病人，並帶著兩人去尋找水源。

他們在方圓幾里地找遍了也不見水源，此時天已將黑，他們便回到營地。眼看病人病情越來越重，在休息了半個時辰之後，他們決定連夜繼續尋找水源。這一次他們在數十里外，繞營地尋找。在他們精疲力竭時，終於找到了水源，只見水邊遍布黃白色半透明晶石，此水喝起來甘甜清涼，甚覺寒涼，飲後頓感神清氣爽。喝

足後便用器皿盛水，爾後趕回營地。原先奄奄一息的中暑病人喝了水後，片刻即愈，生龍活虎，且此水只喝一點便解渴。

後來他們回到城中與一名郎中朋友提及此事，郎中覺得奇怪，便觀察他們的水壺，發現裡面有許多他們夜裡在水源地見到的半透明細碎晶石，並發覺此晶石有清熱解暑之功，因其見於寒涼水石之地，便取名寒水石，為後人所用<sup>1</sup>。

## 二、寒水石的史料記載

寒水石始見於《吳普本草》，別名凝水石、白水石。《綱目》：唐宋諸醫不識此石，而以石膏、方解石為註，誤矣。唐



圖一、北寒水石藥材圖



圖二、南寒水石藥材圖

宋以來，相承其誤，通以二石為用，而鹽精之寒水，絕不知用，此千載之誤也。由此可知如今的寒水石與先前的寒水石具有很大的區別，並且以產地區分成北寒水石與南寒水石，前者產區在於山東、新疆、內蒙古等地，為硫酸鹽類礦物 - 紅石膏 (*Gypsum fibrosum*)，主要成分为含水硫酸鈣 ( $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ )，顏色為粉紅色，雖與常用藥材 - 石膏同名且成分相同，但可依顏色(白色、灰色或淡黃色)區分；後者產區為河南、浙江、西藏等地為碳酸鹽類礦物 - 方解石 (*Calcite*)，主要成分为碳酸鈣 ( $\text{CaCO}_3$ )，具有清熱降火、除煩止咳功能，可用於壯熱煩渴、口乾舌燥、牙痛、小便不利。兩者成分不同，但於用藥的習慣及地區，曾一度被混用<sup>2,3,4</sup>。

### 三、寒水石的性狀特徵

1. 北寒水石 (圖一)：本品為纖維狀集合體，呈扁平塊狀或厚板狀。大小不一，厚 0.5~3.5 cm。淡紅色，有的為白色；

條痕白色。表面凹凸不平，側面呈縱細紋理，具絲絹光澤。質較軟，指甲可刻劃成痕；易砸碎，斷面顯直立纖維狀，粉紅色。氣微，味淡<sup>4</sup>。

2. 南寒水石 (圖二)：本品主為菱面體集合體，成斜方扁塊狀、斜方柱狀。白色，有的帶淺黃或淺紅色調。表面光滑，有稜。透明至半透明；玻璃光澤，用小刀可刻劃成痕。體較重，質硬而脆，易砸碎，碎片成斜方形或斜長方形。無臭，無味<sup>4</sup>。

### 四、寒水石的功能與主治

《中藥大辭典》：「清熱降火，利竅，消腫。治時行熱病，積熱煩渴，吐瀉，水腫，尿閉，齒衄，丹毒，燙傷。<sup>5,6,7</sup>」

《本經》：「主身熱，腹中積聚邪氣，皮中如火燒，煩滿，水飲之。」

《本草綱目集注》：「解巴豆毒。」

《別錄》：「除時氣熱盛，五臟伏熱，胃中熱，煩滿，口渴，水腫，小腹痺。」

《醫學入門》：「治小兒丹毒，燒為末，醋調敷之。」

《綱目》：「治小便白，內痺，涼血降火，止牙疼，堅牙明目。」

《醫林纂要》：「除妄熱，治天行大熱及霍亂吐瀉，心煩口渴，濕熱水腫。」

《本草求真》：「敷湯火傷。」

《本草求原》：「治心腎實熱。」清熱降火；利竅；消腫。

## 五、寒水石的炮製

### 1. 炮製方法<sup>8</sup>

- (1) 寒水石：取原材料，挑去雜質，洗淨後搗碎即可。
- (2) 煅寒水石：取寒水石塊放在爐子的鍋上，於鍋蓋上稍開一小縫，煅約1小時至酥為度。或取寒水石放入坩鍋內，用炭火或無菸火煅至通紅。
- (3) 醋寒水石：取寒水石裝入瓦罐內，置炭火上煅至紅或紅透，倒出，用醋拌勻後碾碎，或投入醋中浸1~2分鐘曬乾。
- (4) 炒寒水石：取寒水石粉，用大火炒約

1小時，放冷即可。

(5) 薑寒水石：先將生薑搗碎取汁，略加清水，再加寒水石入鍋內並煮至汁乾，取出曬乾，研磨即可。

### 2. 炮製目的<sup>9</sup>

《總微》記載「火煅，埋土中，出火毒。」寒水石煅製後失去結晶水，降低大寒之性，消除了伐脾陽的副作用，緩解清熱瀉火的功效，增加了收斂固澀的作用。並且煅製後質地鬆散，易於粉碎及煎出有效成分。

#### (1) 北寒水石炮製後硫酸鈣的變化：

北寒水石是一種主要成分為硫酸鈣的礦物藥，多在蒙醫藥中使用。北寒水石研究結果顯示，炮製品(奶製與酒萃)鈣離子含量均顯著高於相應生品( $P<0.01$ )，其中酒萃法樣品含量升高較多，奶製法含量升高較小，可能是牛奶中的物質與鈣離子形成錯合物所致。(表一)

#### (2) 南寒水石煅製後碳酸鈣的分解反應：

南寒水石的主要成分為碳酸鈣，不同煅製火侯對於寒水石炮製品的性

表一、北寒水石主成分(硫酸鈣)含量測定<sup>9</sup>

( $\bar{x}\pm s$ )

樣品編號	樣品中鈣離子百分含量(%)		
	生品	奶製品	酒製品
A	23.64±0.01	27.28±0.08*	30.41±0.06*
B	24.18±0.03	29.66±0.52*	30.03±0.05*
C	23.51±0.06	28.53±0.37*	29.53±0.07*

狀、鈣離子的溶出量及總成分煎出量均有明顯影響。隨著煅製溫度由低到高，寒水石煅製品的外觀顏色變化：黃白色→灰褐色→淺灰色→灰白色→白色，外觀色澤由深變淺，而脆度則隨溫度升高而增長，並逐漸破碎成粉末狀。

隨著煅製溫度的增加，炮製品收率逐漸下降，於 800°C 的條件下，變化較為明顯，說明在此條件下寒水石其主要成分  $\text{CaCO}_3$  遇強熱產生反應。隨著溫度的升高寒水石煅製品煎劑的  $\text{Ca}^{2+}$  溶出量、總成分煎出率也逐漸增加。在 800°C 以下煅製  $\text{Ca}^{2+}$  溶出量均很小，僅增加 1~3 倍，總成分煎出率僅增加 1.4~2.1 倍；但在 800°C 以下煅製  $\text{Ca}^{2+}$  溶出量大幅增加，增加幅度為 19~43 倍，總成分煎出率也增加 7~11 倍之多。（表二）

### (3) 寒水石炮製後的藥效變化<sup>10</sup>：

南、北寒水石均為難溶性礦物藥，體內的溶解度與藥效發揮密切

相關。採用人工模擬胃腸液的方法研究南北寒水石生品、炮製品中鈣溶出情況。

結果顯示，南、北寒水石在胃環境 (pH=2.0) 中溶出較好，均在 70% 以上，生品、水萃製品在 7 h 即全溶，北寒水石萃製品在 7 h 前溶出率均低於生品、高於奶萃製品，而南寒水石奶萃製品溶出率一直顯著低於生品、水萃製品。（圖三）


胃排空時間為 3~5 h，在胃內酸性條件下未能溶解的寒水石隨著胃腸蠕動進入小腸，在腸環境 (pH=6.8) 內寒水石溶出度顯著降低，南寒水石溶出率低於 10%，北寒水石低於 20%，南寒水石溶出率為生品 < 水萃 < 奶萃，北寒水石為水萃 < 奶萃 < 生品。（圖四）

## 六、結語


寒水石初始來源與現今大有不同，如今常以紅石膏或方解石作為使用，前者多

表二、不同火候南寒水石煅製品性質、鈣離子溶出量及總成分煎出率比較<sup>9</sup>

溫度 (°C)	時間 (min)	煅得率 (%)	$\text{Ca}^{2+}$ 溶出量 (mg/L)	總成分煎出率 (%)	性狀
生品	-	-	0.02±0.01	0.03±0.02	黃白色、質堅硬
600	60	98.09	0.03±0.02	0.04±0.01	灰褐色、質較硬
700	60	97.31	0.09±0.03	0.06±0.01	淺灰色、質較脆
800	60	86.44	0.48±0.05	0.18±0.02	灰白色、質酥脆
900	30	73.57	1.11±0.16	0.32±0.04	白色、質鬆散、易碎



圖三、寒水石在人工胃液中溶出率<sup>10</sup>  
(A. 南寒水石；B. 北寒水石)



圖四、寒水石在人工腸液中溶出率<sup>10</sup>  
(A. 南寒水石；B. 北寒水石)

用於北方，而後者多用於南方，故有北、南寒水石之稱，寒水石生品具有清熱降火、除煩止咳功能，經過炮製後，雖緩解清熱瀉火的功效，但增加了收斂固濕的作用，可用於改善胃腸功能。而炮製後的寒水石會增加鈣離子的濃度與煎劑溶出量，北寒水石炮製後失去結晶水形成無水硫酸鈣，南寒水石則分解成氧化鈣，兩者皆具吸濕性，可在胃中降低胃液的分泌量。

### 參考文獻：

- 張健, 2012, 告訴您每一味中藥的來歷(第1冊), 寒水石的故事, 山西科學技術出版社。
- 夏振江、魏立新、杜玉枝、肖遠燦、呂坪、王東平、楊紅霞、李岑, 2010, 北寒水石質量標準研究, 時珍國醫國藥。
- 夏振江、魏立新、杜玉枝、肖遠燦、呂坪、王東平、楊紅霞、李岑, 2010, 南寒水石質量標準研究, 中南藥學。
- 國家中醫藥管理局中華本草編委會, 1999, 中華本草(一), 第0026項-寒水石, 上海科學技術出版社, 305-307。
- 梁·陶弘景集、尚志鈞輯校, 1986, 凝水石, 中品卷第二, 名醫別錄, 人民衛生出版社, 103-104。
- 梁·陶弘景編、尚志鈞、尚元勝輯校, 1994, 凝水石, 卷第二, 本草經集注(輯校本), 人民衛生出版社, 157-158。
- 江蘇新醫學院, 1995, 寒水石, 下冊, 中藥大辭典, 上海科學技術出版社, 2419-2420。
- 戴新民, 1983, 寒水石, 中藥炮製法, 啟業書局有限公司, 331。
- 賈天柱、許枏, 2015, 寒水石, 中藥炮製化學, 上海科技出版社, 511-515。
- 陸景坤、陳朝軍、周昊菲、劉智杰、毅和, 2012, 寒水石生品、炮製品在人工胃腸液中的溶出率, 中國實驗方劑學雜誌。

# 附子臨床用法探義（下）

臺北市傳愛經典中醫診所 鄭宏足院長

## ※ 附論

《接續上集》

### 壹、乾薑附子湯、茯苓四逆湯的差異

《傷寒論》曰：「下之後，復發汗，晝日煩躁不得眠，夜而安靜，不嘔不渴，無表證，脈沉微，身無大熱者，乾薑附子湯主之。」本條文說明了經過汗下後，身體陽氣已虛，陰氣盛，故造成格陽於外的情形而產生熱症（雖稱無大熱，但亦當有微熱的情形，故其曰不嘔不渴，無表證以排除三陽病熱證的可能）。陰盛陽微，故以乾薑、生附子散其陰壅以回其陽。

《傷寒論》曰：「發汗若下之，病仍不解，煩躁者，茯苓四逆湯主之。」本條文說明了經過汗下後，陽虛陰亦較虛，故除了使用乾薑、生附子之外，其亦用茯苓（四兩）、人參（一兩）以益陰氣，如《本經疏證·茯苓》曰：「陰壅陽微，故振其陽可癒，然徒振其陽，恐致求直反曲，陽雖轉而陰液消亡，故用茯苓以轉陽樞而化陰。」「又恐茯苓不足獨當其任，故益以人參於陰中化津者為之殿，於此見茯苓不特能使陰隨陽化，並能使陽藥不至耗陰，

陰藥不至抑陽，其斡旋之妙，有非他物所能並者。」茯苓可以轉陽樞而化陰，其機理如《本經疏證·茯苓》曰：「下焦之陰能引陽」腎氣得用則可化陰以滋茯苓四逆湯證中陰之不足。除茯苓四逆湯中用茯苓、人參益陰之外，四逆加人參湯證亦屬陽虛陰不足，故以人參一兩益陰。如《傷寒論·霍亂篇》曰：「惡寒脈微而復利，利止，亡血也，四逆加人參湯主之。」此外通脈四逆湯證若見利止脈不出者，知其陰液亦已不足，故以人參二兩益之。

由上觀之，茯苓除可使陰益之外，其亦可「使陽藥不至耗陰」，因乾薑、附子均為大溫熱之藥，用之恐傷陰，故以茯苓益陰。

### 貳、配伍用藥（人參）合證則益陰，不合則壅滯的情形

以上茯苓四逆湯證、四逆加人參湯證、通脈四逆湯證加人參可益陰。但小柴胡湯證稱若胸中煩而不嘔者（去半夏、人參加栝萎實）；若不渴，外有微熱者（去人參加桂枝）；若咳者（去人參、大棗、生薑加五味子、乾薑），以上諸加減之所以去

人參，均為邪盛所致，故去人參以免造成壅滯，柴胡桂枝乾薑湯證之不用人參其理亦同。正如理中湯證中若臍上悸者，腎氣動也（去朮加桂枝）；吐多者（去朮加生薑）；腹滿者（去朮加附子），以上諸加減陽虛甚者或邪盛者均不用白朮，以免其壅滯，苓桂草棗湯之不用朮，其理亦在此。可見用藥對證則可益氣益陰，若不對證則恐壅滯。

### 參、諸方附子之加減

四逆散證若腹中痛者加附子，越婢湯證若惡風者加附子，竹葉湯證若頸項強者加附子，千金三黃湯若先有寒者加附子。

《本經疏證》稱其作用機理為：「附子之治風寒，非直治風寒也，陽氣不榮，風寒侵侮，陽振而風寒自退，附子之利關節，非直利關節也，筋得寒則攣，得熱則弛，筋弛則關節自舒。」

小青龍湯證若嘯者去麻黃加附子。《本經疏證》稱：「附子之治水，非直治水也，水寒相搏為嘯，是中寒，非外寒也，去中寒而水無與搏矣。」

理中丸證若腹滿者去朮加附子。《本經疏證》稱：「附子之治滿，非直治滿也，濁氣上則脹，是陰逆非氣盛也，陽見睺則陰翳消矣。」

真武湯若吐者去附子加生薑。《本經疏證》稱：「夫水本趨下，過頸在山，非其性也，必有激之使然，能激水使上，非

陽不能，故嘔病必胃中有火，胃中有火者，宜散不宜行。」

### 寒熱並用：

《金匱要略》稱先便後血用黃土湯，其屬虛證，故以附子、白朮、黃土溫之，但其內有濕熱夾雜，故以黃芩、地黃、阿膠療血分之熱，黃土湯內之附子用至三兩，黃芩亦用三兩，他方絕無僅有。《傷寒論》：「心下痞，而復惡寒汗出者，附子瀉心湯主之。」其內以大黃、黃連、黃芩瀉裏之鬱熱，以附子溫表寒，亦屬寒熱並用之方。

《金匱要略》：「脅下偏滿痛，發熱，其脈緊弦，此寒也，宜溫藥下之，以大黃附子湯。」大黃附子湯內有大黃、附子、細辛，亦為寒熱並用之方。他方如薏苡附子散、薏苡附子敗醬散、竹葉湯均為寒熱並用之方，而以附子溫之。

### 肆、風濕相搏用方機理

《金匱要略》：「傷寒八、九日，風濕相搏，身體疼煩，不能自轉側，不嘔不渴，脈浮虛而澀者，桂枝附子湯主之；若大便堅，小便自利者，去桂枝加白朮湯主之。」

《金匱要略》：「風濕相搏，骨節疼煩，掣痛不得屈伸，近之則痛劇，汗出短氣，小便不利，惡風不欲去衣，或身微腫者，甘草附子湯主之。」

《傷寒論》：「少陰病，身體痛，手足寒，骨節痛，脈沉者，附子湯主之。」

以上諸方，桂附湯、朮附湯用炮附子三枚；草附湯、附子湯用炮附子二枚，為何前二方痛至體表附子較多，後二方痛至骨節附子反較少，如《本經疏證》稱：「風寒濕之氣，惟其在表，斯為尤猛。」「目前雖急迫，愈期反可早。」故以附子三枚輔以薑棗以速癒之，如桂附湯、朮附湯用法下注云：「一服覺身痺，半日許再服，三服都盡，其人如冒狀勿怪，即是朮附並走皮中，逐水氣未得除故耳！」《本經疏證》解釋曰：「他方下則不言冒，可見兩方取效，視諸證為捷矣。」《本經疏證》稱骨節痛為：「深入之深，則出不能速。」故以附子二枚以緩其功，其下注云：「初服得微汗，則解能食，汗出復煩者，服五合，恐一升多者，宜服六、七合為妙。」

桂附湯條文中稱不嘔不渴，知寒濕襲表較重，侵脾較少，如小青龍湯證有「乾嘔，發熱而渴」，其有寒濕侵脾，故有嘔、渴見症。再如真武湯證見嘔，其亦為寒濕侵脾的結果。

總結以上，附子的功能可內入關節、外達肌表作用於四肢關節，治痛治腫，如真武湯之治四肢沉重疼痛，附子湯、桂附湯、朮附湯、草附湯、桂枝芍藥知母湯、烏頭湯之治四肢疼痛；越婢湯加附子之治肢腫，麻黃附子湯之治腫脹。其亦可作用於胸腹治痛，如附子粳米湯之治腹中寒氣雷鳴切痛，九痛丸之治心痛，烏頭赤石脂丸之治胸痛，薏苡附子散之治胸痺，薏苡

附子敗醬散之治腸癰，大黃附子湯之治脅下痛，四逆散證若腹中痛者加附子，以上諸方用附子均取其溫中止痛之效。附子可溫陽利水，如真武湯、麻黃附子湯、越婢湯加附子、栝萎瞿麥圓。附子可溫陽治虛，如附子瀉心湯之治表虛、桂枝加附子湯之治四肢微急，難以屈伸、桂枝去芍藥加附子湯之治惡寒、芍藥甘草附子湯之治惡寒、附子瀉心湯之治惡寒汗出、麻黃附子細辛湯、麻黃附子甘草湯之治太少兩感，烏梅丸諸方中使附子即取其溫腎陽之功以治虛，《金匱要略》中之用濟生腎氣丸之治腎氣不足，竹葉湯之治產後中風，方中用附子亦屬同功。《金匱要略》中黃土湯（三兩）之用附子即取其溫陽止血之功。附子配乾薑可回陽救逆。

由上可知，附子可治四肢胸腹之腫痛，其亦可溫陽利水，並且有溫陽散陰霾固腎治虛之功，可配乾薑回陽救逆。

#### 參考資料：

1. 清、鄒澍，1997，本經疏證。志遠書局。
2. 李培生主編，1999，漢、張仲景，傷寒論。知音出版社。
3. 李克光主編，1999，漢、張仲景，金匱要略。知音出版社。
4. 雷載權等主編，1998，中華臨床中藥學。人民衛生出版社。
5. 鄭宏足、莊志瑜編著，2018，傷寒金匱方藥速查。知音出版社。



## 好事成雙 『燕鵝洗沐組合』



### 蜂膠控油洗髮精

質地清透，抑制頭皮分泌多餘的油脂，不造成頭皮的負擔，潔淨頭皮與累積於髮根的髒汙油脂，有效淨化、舒緩及防止異味，油膩 Out。



### 燕窩水潤沐浴露

滋養修護，溫和不刺激清潔照顧，不帶走肌膚的水份，注入水透光，沐浴後柔嫩不乾澀、不緊繃、有彈性，留下絲滑水潤觸感，光澤 Up。



### 勝昌美顏樂活館

勝昌製藥廠股份有限公司  
臺北市中正區和平西路二段56號  
桃園市中壢區民族路六段436號  
訂購電話 : 0800-261-099



勝昌官方商城



PChome商店街

# 勝昌製藥與大甲媽同心， 健康守護媽祖ㄟ囉仔

## 中藥產業同心同行，一步一腳印深耕土地

勝昌製藥營業部 潘旭佑

臺灣中藥權威勝昌製藥廠頭一遭！跨界參加全臺最大媽祖繞境活動，分別於 4/11~4/12（嘉義新港奉天宮）、4/13（雲林西螺福興宮）、4/14（彰化北斗奠安宮）等四天與各方香燈腳一同恭迎大甲媽祖。同時，勝昌製藥也與旗下連鎖通路（屈臣氏、大樹藥局、藥健康）擴大合作，一同推出媽祖限定檔期活動，於繞境期間至勝昌製藥廠攤位，領取限量勝昌保庇包，還能獲得指定通路 50 元購物金。

每當颱風來襲，大家心中就會想到護國神山 - 中央山脈，相同的問起臺灣人心中的國家級女神是誰，大家一定會想到『媽祖』。她是臺灣最強天后，不僅深植人心，更是大家生活心靈的寄託，因此長年都有著『三月瘋媽祖』這句諺語持續在臺灣社會流傳著。勝昌此次跟隨大甲媽除了用行動深耕在地，更重要的是祈求中藥產業推動順利，你和我都要平安健康。

大甲媽祖繞境不僅是全球最具規模的宗教慶典之一，也是勝昌製藥首次參與大型跨界宗教活動。我們轉型不限於通路與商品，還必須具備與時俱進的目標，因此

繞境行前也特地前往大甲鎮瀾宮參拜，向大甲媽稟報今年會參與繞境，祈求團隊旅途平安，勝昌製藥諸事順利，筭杯後求得媽祖娘娘的進香旗。進香旗又稱隨香旗，為隨香客隨神祇進香時所隨身攜帶的旗幟，主要的目的在於標示自己參與進香活動時的身分，並祈請神祇護佑，回程後供奉也能保佑隨香客諸事平安。

勝昌製藥是臺灣外銷日本第一的中藥品牌，更是國內第一家通過三階段確效查廠的中藥濃縮製劑廠。勝昌製藥廠陳志中董事長強調，勝昌製藥秉持「救人一命」的企業精神，與媽祖慈悲為懷，濟世救人

同心，近期國內疫情升溫，勝昌製藥已於今年2月中超前佈署，捐贈桃園市、新北市共1,200罐臺灣清冠一號給予大型醫院使用，包括衛生福利部桃園醫院、新北市聯合醫院等，提供醫護人員、軍警消最安心的漢方防疫後盾，同時也與全體國人共度疫情難關。勝昌製藥廠李威著總經理表示，勝昌首次跨界參與媽祖繞境活動，除了與大甲媽同心外，也用行動力推廣新漢方生活，為國人健康做把關。

勝昌製藥以「大醫精誠」為創業初衷，對於所有漢方品質必須以最高規格的製程回饋社會，讓全民享有最安心的漢方商品。為因應國際藥品製造規範，勝昌提前將中藥濃縮製劑水準再升級，已具備更有效且



勝昌製藥向媽祖娘娘求得的進香旗

系統化的確效作業，不僅在品質管控上更加嚴格，也能讓消費者在用藥上得到最安全的保障。更多勝昌商品，民眾可上勝昌美顏樂活館 (<https://shop.herb.com.tw/>) 查詢購買。



繞境民眾熱情參與

# 參訪「臺灣清冠一號」製藥廠 鄭市長感謝勝昌製藥擴大產能 全力守護國人健康

日期：111年6月1日

資料來源：桃園市政府新聞處

桃園市長鄭文燦今（1）日下午前往中壢區，參訪勝昌製藥廠股份有限公司，瞭解藥材儲備情形及藥劑製程。鄭市長表示，勝昌製藥廠 1946 年創立以來已超過 70 年，致力於漢方中藥科學化，也研發許多藥妝產品外銷各國，感謝勝昌製藥廠在疫情期間，多次與政府合作防疫，更是國內少數取得「臺灣清冠一號」臨時藥證生產製造的中藥廠，許多輕症患者經由中醫師遠距

看診後，開立處方箋服用清冠一號，並有海外臺僑及臺商回國購買，深受國人信賴，期許勝昌製藥廠及中醫團隊建立品牌，讓臺灣的中醫領域更加進步。

鄭市長談到，「臺灣清冠一號」由衛福部國家中醫藥研究所、中醫師公會全國聯合會及數家醫學中心進行臨床測試，並獲得衛福部「緊急使用授權」（Emergency Use Authorization, EUA）。相較於 Paxlovid



鄭市長感謝勝昌製藥廠擴大產能，全力守護國人健康。



勝昌製藥廠總經理李威著致詞。

給藥有年齡限制，「臺灣清冠一號」適用於全年齡患者，經中醫師看診後開立使用，對新冠肺炎具有良好的療效，目前國內製作「臺灣清冠一號」的 GMP 中藥濃縮製劑廠共計 8 家，其中 2 家座落於桃園；因應需求提升，勝昌製藥廠也全力採購相關藥材，並調整產線優先製造中藥製劑，以最大產能紓解國內藥材供應問題。

鄭市長提及，去年(110)年疫情期间，勝昌製藥廠捐贈市府萬顆蜂膠晶柔皂，提供本市各公私立高國中小學、市立幼兒園學生，共同落實勤洗手防疫措施；此外，也捐贈部立桃園醫院 500 份中藥防疫茶及 1,000 罐「臺灣清冠一號」，與市府齊心對抗疫情。全市目前有 33 家觀光工廠及產業文化館，「勝昌中草藥探索館」是桃園第 31 家觀光工廠，也是第一家由中藥廠成立的觀光工廠，未來可安排戶外教學活動，促進學生對於用藥安全及漢方中草藥的認識。

勝昌製藥廠總經理李威著表示，勝昌製藥廠自 1946 年成立，2000 年後在桃園發展，2021 年成為全臺第一家也是目前唯一通過三階段確效廠的 PIC/S 中藥製劑廠，



市長參觀勝昌製藥廠產線。



市長參觀製藥流程。

並於 2022 年成為「臺灣清冠一號國家隊」。由於「臺灣清冠一號」可用於孕婦、小朋友及年長者，預估 5 年內治療新冠肺炎人數可達 350 萬，可創造出將近新台幣 200 億產值。

李總經理也談到，在藥材庫存充足的情況下，勝昌「臺灣清冠一號」產能每月



「臺灣清冠一號」適用於全年齡患者，獲得衛福部「緊急使用授權」(EUA)。



「臺灣清冠一號」藥材。

可安排 20 批，共計 7,200 公斤；其中 80% 供應臺灣市場，只保留 1 批供應國外市場。由於目前確診人數多，確診者可先透過衛福部「健康益友」APP，查詢備有「臺灣清冠一號」的中醫診所，並呼籲未確診的

民眾毋須囤積，將藥物保留給確診者使用。

今日包括立法委員黃世杰、市府經發局長郭裕信、衛生局長王文彥、中壢區長鄭詩鈺、勝昌製藥廠總經理李威著等均一同參訪。



市長與貴賓參訪勝昌製藥廠。

# 用藥問藥師



## 看懂藥品標示五哉問！

### 一問 這個藥品我可以服用嗎？

- 清楚描述自己的身體狀況（症狀、發生時間）
- 告知目前使用的藥品、保健品
- 告知是否有抽菸、喝酒等習慣

### 二問 我是以下族群，可以服用這個藥嗎？

- 注意藥品標示的不得使用族群
- 有無重大疾病

### 三問 我該如何使用這個藥品？

- 依醫師、藥師或藥劑生指示服用藥品
- 詳讀藥品外盒、說明書（仿單）標示的用法用量

### 四問 我該注意那些事情？

- 認明品名、藥品許可證字號
- 留意製造日期和保存期限
- 確實依照藥品外盒、說明書（仿單）服用
- 正確服用藥品後，症狀仍未改善，應儘速就醫

### 五問 我該如何取得更多藥品資訊？

- 記錄藥師的諮詢電話，方便日後諮詢
- 至<http://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001.aspx> 網頁查詢藥品資訊



# 勝昌藥品成方 GMP 製劑要覽

## 一、濃縮方劑

F01010 乙字湯  
F01020 一貫煎  
F02020 九味羌活湯  
F02030 二朮湯  
F02040 二陳湯  
F02050 人參肥兒丸  
F02060 人參敗毒散  
F02070 人參養榮湯  
F02080 八仙湯  
F02090 八正散  
F02100 八味地黃丸  
F02110 八味帶下方  
F02120 八珍湯  
F02130 十六味流氣飲  
F02140 十全大補湯  
F02150 十味香薷飲  
F02160 十味敗毒湯  
F02170 十神湯  
F02180 七寶美髯丹  
F02190 七物降下湯  
F03010 香薷飲  
F03020 三痹湯  
F03030 三黃石膏湯  
F03040 三黃瀉心湯  
F03050 上中下通用痛風丸  
F03060 大承氣湯  
F03070 大青龍湯  
F03080 大建中湯  
F03090 大柴胡湯  
F03100 大秦艽湯  
F03110 大黃牡丹皮湯  
F03120 女科柏子仁丸  
F03130 小半夏加茯苓湯  
F03140 小承氣湯  
F03150 小青龍湯  
F03160 小建中湯  
F03170 小活絡丹  
F03180 小柴胡湯  
F03190 小陷胸湯  
F03200 小續命湯  
F03210 川芎茶調散  
F03220 大柴胡湯去大黃  
F03230 小柴胡湯去參  
F03240 小蘆飲子  
F04010 五皮飲  
F04020 五苓散  
F04030 五淋散  
F04040 五積散  
F04060 六君子湯  
F04070 六味地黃丸  
F04080 六和湯  
F04090 分消湯  
F04100 升陽益胃湯  
F04110 升麻葛根湯  
F04120 天王補心丹  
F04130 木防己湯  
F04140 木香楂榔丸  
F04160 止嗽散  
F04170 少腹逐瘀湯  
F04180 天麻鈎藤飲  
F05010 代赭旋覆湯  
F05020 加味平胃散  
F05030 加味逍遙散  
F05040 夏半天麻白朮湯  
F05050 半夏厚朴湯  
F05060 半夏瀉心湯  
F05070 右歸丸  
F05090 四君子湯  
F05100 四味香薷飲

## F05110 四物湯

F05120 四逆散  
F05130 四逆湯  
F05140 左歸丸  
F05150 平胃散  
F05160 正骨紫金丹  
F05170 玉女煎  
F05180 玉屏風散  
F05190 甘麥大棗湯  
F05200 甘露消毒丹  
F05210 甘露飲  
F05220 生化湯  
F05230 生脈散  
F05240 白虎加人參湯  
F05250 白虎湯  
F05260 白頭翁湯  
F05270 安中散  
F05280 四神丸  
F05290 瓜萎枳實湯  
F05310 玉泉丸  
F05320 平肝流氣飲  
F06010 托裏消毒飲  
F06020 百合固金湯  
F06030 竹葉石膏湯  
F06040 血府逐瘀湯  
F06060 竹茹溫膽湯  
F07010 吳茱萸湯  
F07020 抑肝散  
F07030 折衝散  
F07040 杏蘇散  
F07050 杞菊地黃丸  
F07060 苓藥甘草湯  
F07070 苓湯  
F07080 茵陳膠艾湯  
F07090 辛夷清肺湯  
F07100 辛夷散  
F07110 防已黃耆湯  
F07120 防風通聖散  
F07130 完帶湯  
F07150 身痛逐瘀湯  
F07170 沙參麥冬湯  
F08010 兒科杏蘇散  
F08020 定喘湯  
F08030 治癥固本丸  
F08040 炙甘草湯  
F08050 知柏地黃丸  
F08060 灸活湯濕湯  
F08070 金水六君煎  
F08080 金沸草散  
F08090 當歸散  
F08100 金鎖固精丸  
F08110 附子理中湯  
F08120 定喘湯  
F08140 定志丸  
F08170 肥兒八珍糕  
F09010 保元柴胡清肝散  
F09020 保安腎  
F09030 保和丸  
F09040 保產無憂方  
F09050 厚朴溫中湯  
F09060 枳縮二陳湯  
F09070 柴胡加龍骨牡蠣湯  
F09080 柴胡桂枝湯  
F09090 柴胡桂枝乾薑湯  
F09100 柴胡清肝湯  
F09110 柴胡疏肝湯  
F09130 柴陷湯  
F09140 柴葛解肌湯  
F09150 洗肝明目湯  
F09160 胃苓湯

## F09170 胃舒寧

F09180 茅甘薑味辛夏仁湯  
F09190 茅桂朮甘湯  
F09200 香芎湯  
F09210 香砂六君子湯  
F09240 香砂平胃散  
F09220 香砂養胃湯  
F09230 香蘇散  
F10010 射干麻黃湯  
F10030 桂枝加朮附湯  
F10040 桂枝加芍藥湯  
F10050 桂枝加龍骨牡蠣湯  
F10060 桂枝芍藥知母湯  
F10070 桂枝茯苓丸  
F10080 桂枝湯  
F10090 桃紅四物湯  
F10100 桃核承氣湯  
F10110 桑菊飲  
F10120 桑螵蛸散  
F10130 桔梗湯  
F10140 消風散  
F10150 消痔丸  
F10170 烏藥順氣散  
F10180 益血力  
F10190 益氣聰明湯  
F10200 真人命飲  
F10210 真武湯  
F10220 神秘湯  
F10230 秦艽鱉甲散  
F10240 茯菟丹  
F10250 茵陳五苓散  
F10260 茵陳蒿湯  
F10270 荆防敗毒散  
F10280 荆芥連翹湯  
F10290 荊芥散  
F10300 參苓白朮散  
F10310 參白朮散  
F10320 參白朮散  
F10330 參白朮散  
F10340 參白朮散  
F10350 參白朮散  
F10360 參白朮散  
F10370 參白朮散  
F10380 參白朮散  
F10390 參白朮散  
F10400 參白朮散  
F10410 參白朮散  
F10420 參白朮散  
F10430 參白朮散  
F10440 參白朮散  
F10450 參白朮散  
F10460 參白朮散  
F10470 參白朮散  
F10480 參白朮散  
F10490 參白朮散  
F10500 參白朮散  
F10510 參白朮散  
F10520 參白朮散  
F10530 參白朮散  
F10540 參白朮散  
F10550 參白朮散  
F10560 參白朮散  
F10570 參白朮散  
F10580 參白朮散  
F10590 參白朮散  
F10600 參白朮散  
F10610 參白朮散  
F10620 參白朮散  
F10630 參白朮散  
F10640 參白朮散  
F10650 參白朮散  
F10660 參白朮散  
F10670 參白朮散  
F10680 參白朮散  
F10690 參白朮散  
F10700 參白朮散  
F10710 參白朮散  
F10720 參白朮散  
F10730 參白朮散  
F10740 參白朮散  
F10750 參白朮散  
F10760 參白朮散  
F10770 參白朮散  
F10780 參白朮散  
F10790 參白朮散  
F10800 參白朮散  
F10810 參白朮散  
F10820 參白朮散  
F10830 參白朮散  
F10840 參白朮散  
F10850 參白朮散  
F10860 參白朮散  
F10870 參白朮散  
F10880 參白朮散  
F10890 參白朮散  
F10900 參白朮散  
F10910 參白朮散  
F10920 參白朮散  
F10930 參白朮散  
F10940 參白朮散  
F10950 參白朮散  
F10960 參白朮散  
F10970 參白朮散  
F10980 參白朮散  
F10990 參白朮散  
F11000 參白朮散  
F11010 參白朮散  
F11020 參白朮散  
F11030 參白朮散  
F11040 參白朮散  
F11050 參白朮散  
F11060 參白朮散  
F11070 參白朮散  
F11080 參白朮散  
F11090 參白朮散  
F11100 參白朮散  
F11110 參白朮散  
F11120 參白朮散  
F11130 參白朮散  
F11140 參白朮散  
F11150 參白朮散  
F11160 參白朮散  
F11170 參白朮散  
F11180 參白朮散  
F11190 參白朮散  
F11200 參白朮散  
F11210 參白朮散  
F11220 參白朮散  
F11230 參白朮散  
F11240 參白朮散  
F11250 參白朮散  
F11260 參白朮散  
F11270 參白朮散  
F11280 參白朮散  
F11290 參白朮散  
F11300 參白朮散  
F11310 參白朮散  
F11320 參白朮散  
F11330 參白朮散  
F11340 參白朮散  
F11350 參白朮散  
F11360 參白朮散  
F11370 參白朮散  
F11380 參白朮散  
F11390 參白朮散  
F11400 參白朮散  
F11410 參白朮散  
F11420 參白朮散  
F11430 參白朮散  
F11440 參白朮散  
F11450 參白朮散  
F11460 參白朮散  
F11470 參白朮散  
F11480 參白朮散  
F11490 參白朮散  
F11500 參白朮散  
F11510 參白朮散  
F11520 參白朮散  
F11530 參白朮散  
F11540 參白朮散  
F11550 參白朮散  
F11560 參白朮散  
F11570 參白朮散  
F11580 參白朮散  
F11590 參白朮散  
F11600 參白朮散  
F11610 參白朮散  
F11620 參白朮散  
F11630 參白朮散  
F11640 參白朮散  
F11650 參白朮散  
F11660 參白朮散  
F11670 參白朮散  
F11680 參白朮散  
F11690 參白朮散  
F11700 參白朮散  
F11710 參白朮散  
F11720 參白朮散  
F11730 參白朮散  
F11740 參白朮散  
F11750 參白朮散  
F11760 參白朮散  
F11770 參白朮散  
F11780 參白朮散  
F11790 參白朮散  
F11800 參白朮散  
F11810 參白朮散  
F11820 參白朮散  
F11830 參白朮散  
F11840 參白朮散  
F11850 參白朮散  
F11860 參白朮散  
F11870 參白朮散  
F11880 參白朮散  
F11890 參白朮散  
F11900 參白朮散  
F11910 參白朮散  
F11920 參白朮散  
F11930 參白朮散  
F11940 參白朮散  
F11950 參白朮散  
F11960 參白朮散  
F11970 參白朮散  
F11980 參白朮散  
F11990 參白朮散  
F12000 參白朮散  
F12010 散瘍膏  
F12020 普濟消毒飲  
F12030 疏肝湯  
F12040 疏經活血湯  
F12050 菖蒲鬱金散  
F12060 華蓋散  
F12070 萃解分清飲  
F12080 趙婢加朮湯  
F12090 趙鞠丸  
F12100 黃芩湯  
F12110 黃耆五物湯  
F12120 黃耆建中湯  
F12130 黃連上清丸  
F12140 黃連解毒湯  
F12150 鈎藤散  
F12160 黃連解毒湯  
F12170 黃連解毒湯  
F12180 黃連解毒湯  
F12190 黃連解毒湯  
F12200 黃連解毒湯  
F12210 黃連解毒湯  
F12220 黃連解毒湯  
F12230 黃連解毒湯  
F12240 黃連解毒湯  
F12250 黃連解毒湯  
F12260 黃連解毒湯  
F12270 黃連解毒湯  
F12280 黃連解毒湯  
F12290 黃連解毒湯  
F12300 黃連解毒湯  
F12310 黃連解毒湯  
F12320 黃連解毒湯  
F12330 黃連解毒湯  
F12340 黃連解毒湯  
F12350 黃連解毒湯  
F12360 黃連解毒湯  
F12370 黃連解毒湯  
F12380 黃連解毒湯  
F12390 黃連解毒湯  
F12400 黃連解毒湯  
F12410 黃連解毒湯  
F12420 黃連解毒湯  
F12430 黃連解毒湯  
F12440 黃連解毒湯  
F12450 黃連解毒湯  
F12460 黃連解毒湯  
F12470 黃連解毒湯  
F12480 黃連解毒湯  
F12490 黃連解毒湯  
F12500 黃連解毒湯  
F12510 黃連解毒湯  
F12520 黃連解毒湯  
F12530 黃連解毒湯  
F12540 黃連解毒湯  
F12550 黃連解毒湯  
F12560 黃連解毒湯  
F12570 黃連解毒湯  
F12580 黃連解毒湯  
F12590 黃連解毒湯  
F12600 黃連解毒湯  
F12610 黃連解毒湯  
F12620 黃連解毒湯  
F12630 黃連解毒湯  
F12640 黃連解毒湯  
F12650 黃連解毒湯  
F12660 黃連解毒湯  
F12670 黃連解毒湯  
F12680 黃連解毒湯  
F12690 黃連解毒湯  
F12700 黃連解毒湯  
F12710 黃連解毒湯  
F12720 黃連解毒湯  
F12730 黃連解毒湯  
F12740 黃連解毒湯  
F12750 黃連解毒湯  
F12760 黃連解毒湯  
F12770 黃連解毒湯  
F12780 黃連解毒湯  
F12790 黃連解毒湯  
F12800 黃連解毒湯  
F12810 黃連解毒湯  
F12820 黃連解毒湯  
F12830 黃連解毒湯  
F12840 黃連解毒湯  
F12850 黃連解毒湯  
F12860 黃連解毒湯  
F12870 黃連解毒湯  
F12880 黃連解毒湯  
F12890 黃連解毒湯  
F12900 黃連解毒湯  
F12910 黃連解毒湯  
F12920 黃連解毒湯  
F12930 黃連解毒湯  
F12940 黃連解毒湯  
F12950 黃連解毒湯  
F12960 黃連解毒湯  
F12970 黃連解毒湯  
F12980 黃連解毒湯  
F12990 黃連解毒湯  
F13000 黃連解毒湯  
F13010 黃連解毒湯  
F13020 黃連解毒湯  
F13030 黃連解毒湯  
F13040 黃連解毒湯  
F13050 黃連解毒湯  
F13060 黃連解毒湯  
F13070 黃連解毒湯  
F13080 黃連解毒湯  
F13090 黃連解毒湯  
F13100 黃連解毒湯  
F13110 黃連解毒湯  
F13120 黃連解毒湯  
F13130 黃連解毒湯  
F13140 黃連解毒湯  
F13150 黃連解毒湯  
F13160 黃連解毒湯  
F13170 黃連解毒湯  
F13180 黃連解毒湯  
F13190 黃連解毒湯  
F13200 黃連解毒湯  
F13210 黃連解毒湯  
F13220 黃連解毒湯  
F13230 黃連解毒湯  
F13240 黃連解毒湯  
F13250 黃連解毒湯  
F13260 黃連解毒湯  
F13270 黃連解毒湯  
F13280 黃連解毒湯  
F13290 黃連解毒湯  
F13300 黃連解毒湯  
F13310 黃連解毒湯  
F13320 黃連解毒湯  
F13330 黃連解毒湯  
F13340 黃連解毒湯  
F13350 黃連解毒湯  
F13360 黃連解毒湯  
F13370 黃連解毒湯  
F13380 黃連解毒湯  
F13390 黃連解毒湯  
F13400 黃連解毒湯  
F13410 黃連解毒湯  
F13420 黃連解毒湯  
F13430 黃連解毒湯  
F13440 黃連解毒湯  
F13450 黃連解毒湯  
F13460 黃連解毒湯  
F13470 黃連解毒湯  
F13480 黃連解毒湯  
F13490 黃連解毒湯  
F13500 黃連解毒湯  
F13510 黃連解毒湯  
F13520 黃連解毒湯  
F13530 黃連解毒湯  
F13540 黃連解毒湯  
F13550 黃連解毒湯  
F13560 黃連解毒湯  
F13570 黃連解毒湯  
F13580 黃連解毒湯  
F13590 黃連解毒湯  
F13600 黃連解毒湯  
F13610 黃連解毒湯  
F13620 黃連解毒湯  
F13630 黃連解毒湯  
F13640 黃連解毒湯  
F13650 黃連解毒湯  
F13660 黃連解毒湯  
F13670 黃連解毒湯  
F13680 黃連解毒湯  
F13690 黃連解毒湯  
F13700 黃連解毒湯  
F13710 黃連解毒湯  
F13720 黃連解毒湯  
F13730 黃連解毒湯  
F13740 黃連解毒湯  
F13750 黃連解毒湯  
F13760 黃連解毒湯  
F13770 黃連解毒湯  
F13780 黃連解毒湯  
F13790 黃連解毒湯  
F13800 黃連解毒湯  
F13810 黃連解毒湯  
F13820 黃連解毒湯  
F13830 黃連解毒湯  
F13840 黃連解毒湯  
F13850 黃連解毒湯  
F13860 黃連解毒湯  
F13870 黃連解毒湯  
F13880 黃連解毒湯  
F13890 黃連解毒湯  
F13900 黃連解毒湯  
F13910 黃連解毒湯  
F13920 黃連解毒湯  
F13930 黃連解毒湯  
F13940 黃連解毒湯  
F13950 黃連解毒湯  
F13960 黃連解毒湯  
F13970 黃連解毒湯  
F13980 黃連解毒湯  
F13990 黃連解毒湯  
F14000 黃連解毒湯  
F14010 黃連解毒湯  
F14020 黃連解毒湯  
F14030 黃連解毒湯  
F14040 黃連解毒湯  
F14050 黃連解毒湯  
F14060 黃連解毒湯  
F14070 黃連解毒湯  
F14080 黃連解毒湯  
F14090 黃連解毒湯  
F14100 黃連解毒湯  
F14110 黃連解毒湯  
F14120 黃連解毒湯  
F14130 黃連解毒湯  
F14140 黃連解毒湯  
F14150 黃連解毒湯  
F14160 黃連解毒湯  
F14170 黃連解毒湯  
F14180 黃連解毒湯  
F14190 黃連解毒湯  
F14200 黃連解毒湯  
F14210 黃連解毒湯  
F14220 黃連解毒湯  
F14230 黃連解毒湯  
F14240 黃連解毒湯  
F14250 黃連解毒湯  
F14260 黃連解毒湯  
F14270 黃連解毒湯  
F14280 黃連解毒湯  
F14290 黃連解毒湯  
F14300 黃連解毒湯  
F14310 黃連解毒湯  
F14320 黃連解毒湯  
F14330 黃連解毒湯  
F14340 黃連解毒湯  
F14350 黃連解毒湯  
F14360 黃連解毒湯  
F14370 黃連解毒湯  
F14380 黃連解毒湯  
F14390 黃連解毒湯  
F14400 黃連解毒湯  
F14410 黃連解毒湯  
F14420 黃連解毒湯  
F14430 黃連解毒湯  
F14440 黃連解毒湯  
F14450 黃連解毒湯  
F14460 黃連解毒湯  
F14470 黃連解毒湯  
F14480 黃連解毒湯  
F14490 黃連解毒湯  
F14500 黃連解毒湯  
F14510 黃連解毒湯  
F14520 黃連解毒湯  
F14530 黃連解毒湯  
F14540 黃連解毒湯  
F14550 黃連解毒湯  
F14560 黃連解毒湯  
F14570 黃連解毒湯  
F14580 黃連解毒湯  
F14590 黃連解毒湯  
F14600 黃連解毒湯  
F14610 黃連解毒湯  
F14620 黃連解毒湯  
F14630 黃連解毒湯  
F14640 黃連解毒湯  
F14650 黃連解毒湯  
F14660 黃連解毒湯  
F14670 黃連解毒湯  
F14680 黃連解毒湯  
F14690 黃連解毒湯  
F14700 黃連解毒湯  
F14710 黃連解毒湯  
F14720 黃連解毒湯  
F14730 黃連解毒湯  
F14740 黃連解毒湯  
F14750 黃連解毒湯  
F14760 黃連解毒湯  
F14770 黃連解毒湯  
F14780 黃連解毒湯  
F14790 黃連解毒湯  
F14800 黃連解毒湯  
F14810 黃連解毒湯  
F14820 黃連解毒湯  
F14830 黃連解毒湯  
F14840 黃連解毒湯  
F14850 黃連解毒湯  
F14860 黃連解毒湯  
F14870 黃連解毒湯  
F14880 黃連解毒湯  
F14890 黃連解毒湯  
F14900 黃連解毒湯  
F14910 黃連解毒湯  
F14920 黃連解毒湯  
F14930 黃連解毒湯  
F14940 黃連解毒湯  
F14950 黃連解毒湯  
F14960 黃連解毒湯  
F14970 黃連解毒湯  
F14980 黃連解毒湯  
F14990 黃連解毒湯  
F15000 黃連解毒湯  
F15010 黃連解毒湯  
F15020 黃連解毒湯  
F15030 黃連解毒湯  
F15040 黃連解毒湯  
F15050 黃連解毒湯  
F15060 黃連解毒湯  
F15070 黃連解毒湯  
F15080 黃連解毒湯  
F15090 黃連解毒湯  
F15100 黃連解毒湯  
F15110 黃連解毒湯  
F15120 黃連解毒湯  
F15130 黃連解毒湯  
F15140 黃連解毒湯  
F15150 黃連解毒湯  
F15160 黃連解毒湯  
F15170 黃連解毒湯  
F15180 黃連解毒湯  
F15190 黃連解毒湯  
F15200 黃連解毒湯  
F15210 黃連解毒湯  
F15220 黃連解毒湯  
F15230 黃連解毒湯  
F15240 黃連解毒湯  
F15250 黃連解毒湯  
F15260 黃連解毒湯  
F15270 黃連解毒湯  
F15280 黃連解毒湯  
F15290 黃連解毒湯  
F15300 黃連解毒湯  
F15310 黃連解毒湯  
F15320 黃連解毒湯  
F15330 黃連解毒湯  
F15340 黃連解毒湯  
F15350 黃連解毒湯  
F15360 黃連解毒湯  
F15370 黃連解毒湯  
F15380 黃連解毒湯  
F15390 黃連解毒湯  
F15400 黃連解毒湯  
F15410 黃連解毒湯  
F15420 黃連解毒湯  
F15430 黃連解毒湯  
F15440 黃連解毒湯  
F15450 黃連解毒湯  
F15460 黃連解毒湯  
F15470 黃連解毒湯  
F15480 黃連解毒湯  
F15490 黃連解毒湯  
F15500 黃連解毒湯  
F15510 黃連解毒湯  
F15520 黃連解毒湯  
F15530 黃連解毒湯  
F15540 黃連解毒湯  
F15550 黃連解毒湯  
F15560 黃連解毒湯  
F15570 黃連解毒湯  
F15580 黃連解毒湯  
F15590 黃連解毒湯  
F15600 黃連解毒湯  
F15610 黃連解毒湯  
F15620 黃連解毒湯  
F15630 黃連解毒湯  
F15640 黃連解毒湯  
F15650 黃連解毒湯  
F15660 黃連解毒湯  
F15670 黃連解毒湯  
F15680 黃連解毒湯  
F15690 黃連解毒湯  
F15700 黃連解毒湯  
F15710 黃連解毒湯  
F15720 黃連解毒湯  
F15730 黃連解毒湯  
F15740 黃連解毒湯  
F15750 黃連解毒湯  
F15760 黃連解毒湯  
F15770 黃連解毒湯  
F15780 黃連解毒湯  
F15790 黃連解毒湯  
F15800 黃連解毒湯  
F15810 黃連解毒湯  
F15820 黃連解毒湯  
F15830 黃連解毒湯  
F15840 黃連解毒湯  
F15850 黃連解毒湯  
F15860 黃連解毒湯  
F15870 黃連解毒湯  
F15880 黃連解毒湯  
F15890 黃連解毒湯  
F15900 黃連解毒湯  
F15910 黃連解毒湯  
F15920 黃連解毒湯  
F15930 黃連解毒湯  
F15940 黃連解毒湯  
F15950 黃連解毒湯  
F15960 黃連解毒湯  
F15970 黃連解毒湯  
F15980 黃連解毒湯  
F15990 黃連解毒湯  
F16000 黃連解毒湯  
F16010 黃連解毒湯  
F16020 黃連解毒湯  
F16030 黃連解毒湯  
F16040 黃連解毒湯  
F16050 黃連解毒湯  
F16060 黃連解毒湯  
F16070 黃連解毒湯  
F16080 黃連解毒湯  
F16090 黃連解毒湯  
F16100 黃連解毒湯  
F16110 黃連解毒湯  
F16120 黃連解毒湯  
F16130 黃連解毒湯  
F16140 黃連解毒湯  
F16150 黃連解毒湯  
F16160 黃連解毒湯  
F16170 黃連解毒湯  
F16180 黃連解毒湯  
F16190 黃連解毒湯  
F16200 黃連解毒湯  
F16210 黃連解毒湯  
F16220 黃連解毒湯  
F16230 黃連解毒湯  
F16240 黃連解毒湯  
F16250 黃連解毒湯  
F16260 黃連解毒湯  
F16270 黃連解毒湯  
F16280 黃連解毒湯  
F16290 黃連解毒湯  
F16300 黃連解毒湯  
F16310 黃連解毒湯  
F16320 黃連解毒湯  
F16330 黃連解毒湯  
F16340 黃連解毒湯  
F16350 黃連解毒湯  
F16360 黃連解毒湯  
F16370 黃連解毒湯  
F16380 黃連解毒湯  
F16390 黃連解毒湯  
F16400 黃連解毒湯  
F16410 黃連解毒湯  
F16420 黃連解毒湯  
F16430 黃連解毒湯  
F16440 黃連解毒湯  
F16450 黃連解毒湯  
F16460 黃連解毒湯  
F16470 黃連解毒湯  
F16480 黃連解毒湯  
F16490 黃連解毒湯  
F16500 黃連解毒湯  
F16510 黃連解毒湯  
F16520 黃連解毒湯  
F16530 黃連解毒湯  
F16540 黃連解毒湯  
F16550 黃連解毒湯  
F16560 黃連解毒湯  
F16570 黃連解毒湯  
F16580 黃連解毒湯  
F16590 黃連解毒湯  
F16600 黃連解毒湯  
F16610 黃連解毒湯  
F16620 黃連解毒湯  
F16630 黃連解毒湯  
F16640 黃連解毒湯  
F16650 黃連解毒湯  
F16660 黃連解毒湯  
F16670 黃連解毒湯  
F16680 黃連解毒湯  
F16690 黃連解毒湯  
F16700 黃連解毒湯  
F16710 黃連解毒湯  
F16720 黃連解毒湯  
F16730 黃連解毒湯  
F16740 黃連解毒湯  
F16750 黃連解毒湯  
F16760 黃連解毒湯  
F16770 黃連解毒湯  
F16780 黃連解毒湯  
F16790 黃連解毒湯  
F16800 黃連解毒湯  
F16810 黃連解毒湯  
F16820 黃連解毒湯  
F16830 黃連解毒湯  
F16840 黃連解毒湯  
F16850 黃連解毒湯  
F16860 黃連解毒湯  
F16870 黃連解毒湯  
F16880 黃連解毒湯  
F16890 黃連解毒湯  
F16900 黃連解毒湯  
F16910 黃連解毒湯  
F16920 黃連解毒湯  
F16930 黃連解毒湯  
F16940 黃連解毒湯  
F16950 黃連解毒湯  
F16960 黃連解毒湯  
F16970 黃連解毒湯  
F16980 黃連解毒湯  
F16990 黃連解毒湯  
F17000 黃連解毒湯  
F17010 黃連解毒湯  
F17020 黃連解毒湯  
F17030 黃連解毒湯  
F17040 黃連解毒湯  
F17050 黃連解毒湯  
F17060 黃連解毒湯  
F17070 黃連解毒湯  
F17080 黃連

# 健胃散

腸胃不適，胃酸過多，胃脘脹痛。

使用勝昌健胃散讓您減緩不適，輕鬆自在。

【適應症】胃納滯化疼痛、胃酸過多、  
懊悶、嘔水、噯酸。

衛署成製字第 012870 號

桃市中藥廣字第 1081010032 號

盒裝/450g



瓶裝/80g



# 健胃整腸

公司：臺北市中正區和平西路二段56號 (寧波西街口)

工廠：桃園市中壢區民族路六段436,436-1號

服務專線：0800-261-030 諮詢專線：0800-456-889

網址：[www.herb.com.tw](http://www.herb.com.tw)

# 延年回春丹



固根本、潤氣色



補氣益血、養心益智、強身健體、  
增進活力、天然植物藥材依循古方製成

【效 賦】：補益脾腎，固本培元  
【適應症】：諸虛百損、鬚髮早白、腰腳痠軟

勝昌製藥廠

六十餘年製藥經驗，產品通過各項檢驗，品質好、  
藥效佳、絕不含塑化劑，消費者請安心選購。

服務專線：0800-261-030

請洽勝昌藥品服務處或各地中藥行購買

衛署 成製字第0111121號  
桃市中藥廣字第 1081110019 號



勝昌製藥廠股份有限公司  
Sheng Chang Pharmaceutical Co., Ltd

公司：台北市中正區和平西路二段56號（寧波西街口）  
工廠：桃園市中壢區民族路六段436號  
電話：02-23011268  
網址：[www.herb.com.tw](http://www.herb.com.tw)